

SOLUCIÓN SPOT- ON  
**PULMAX**<sup>®</sup>  
USO VETERINARIO  
Venta libre en locales con asesoramiento profesional veterinario

**Antiparasitario Externo**  
**Piretrinas y piretroides - Imidacloprid**

**SPOT-ON**  
**USO VETERINARIO**

**FORMULA:** Cada 100 ml contiene

Permetrina *	40,0 g
Imidacloprid	8,0 g
Butóxido de piperonilo	3,0 g
Excipientes c.s.p.	100 ml

\* [2,2-dimetil-3-(2,2-diclorovinil) ciclopropil-1-carboxilato-3-fenoxibencilo]  
\*\* 1-(2-cloro-5-piridilmetil)-2-(nitroimino) imidazolidina.

**INDICACIONES:** Antiparasitario externo para la prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas en caninos.

**ADMINISTRACION:** Uso externo. Aplicar el líquido a lo largo del cuello, entre la nuca y el comienzo del dorso, separando el pelo y aplicando sobre la piel del animal.

**ESPECIES:** Caninos

**VENTA SIN RECETA EN LOCALES CON ASESORAMIENTO PROFESIONAL VETERINARIO**



**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, ANIMALES Y ALIMENTOS.**

**LOS ENVASES UTILIZADOS DEBERÁN SER DESCARTADOS DE ACUERDO A LA LEGISLACIÓN LOCAL VIGENTE.**

**CONSERVAR EL PRODUCTO EN SU ENVASE ORIGINAL AL ABRIGO DE LA LUZ, ENTRE 10 Y 25 °C.**

**PRESENTACIONES:**

Pipeta Contenido: 0,75 ml; 1,5 ml; 3 ml; 6 ml y 9,0 ml



**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS:** Veneno. Manipular con cuidado. No aspirar ni ingerir. Evitar el contacto con la piel y mucosas. Lavarse las manos con abundante agua y jabón después de su uso. Evitar la contaminación de los alimentos.

**DOSIS:**

de 2 a 5 kg	..... 1 pipeta de 0,75 ml
de 6 a 10 kg	..... 1 pipeta de 1,50 ml
de 11 a 20 kg	..... 1 pipeta de 3,00 ml
de 21 a 40 kg	..... 1 pipeta de 6,00 ml
de 41 a 60 kg	..... 1 pipeta de 9,00 ml

Una aplicación de este producto previene infestaciones por pulgas por un período de cuatro semanas. Ante una carga parasitaria ambiental alta se recomienda fumigar el mismo para favorecer la eficacia del producto sobre el animal. No mojar al animal un mínimo de tres días antes y tres días después de la aplicación del producto. Tanto el baño higiénico como el medicado pueden acortar el período de residualidad del producto.

**CONTRAINDICACIONES:** Hipersensibilidad a algunos de sus principios activos. No aplicar sobre la piel lesionada. No utilizar en animales menores a diez semanas de vida. No administrar a hembras preñadas, animales debilitados ni animales menos de dos kg de peso. **NO UTILIZAR EN FELINOS.**

**PRIMEROS AUXILIOS EN SERES HUMANOS:**

No hay un antídoto específico. En caso de ingestión provocar el vómito. En caso de lesiones en la piel, lavar con abundante agua y jabón. En caso irritación ocular enjuagar con abundante agua. Si la irritación persiste, llamar al médico y/o al **Centro Nacional de Intoxicaciones: Tel 0800-333-0160**

**INDUSTRIA ARGENTINA**

■ SENASA Ext. del Cert. N° 14-059

Establecimiento Elaborador N° 8531

Dir. Técnico: Med. Vet. Rubén Eduardo Colucci

Mat. N° 99 | Cons. Vet. Prov. Misiones

Comercializa: Asenjo Eduardo

C.U.I.T. N° 20-30786053-9 | Cert. N° 12296

Mail: info@farvet.com.ar | Web: www.pipetapulmax.com.ar